

Indlægsseddel: Information til brugeren

Basiron gel 5 % og 10 % Benzoylperoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Basiron nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Basiron
3. Sådan skal du bruge Basiron
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Basiron forhindrer vækst af aknebakterien. Basiron fremmer også afskalning af huden og fjerner derved det overskydende hornlag, der lukker talgkirtlerne og porerne i huden.

Du kan bruge Basiron til at behandle bumser (acne vulgaris).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Basiron

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Basiron

Hvis du er allergisk over for benzoylperoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Basiron (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kun til udvortes brug.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Basiron.

Hvis du får en mild brændende fornemmelse, rødme og afskalning på det hudområde, du behandler med Basiron, og den brændende fornemmelse ikke holder op efter et par dages pause med behandlingen.

Vær opmærksom på:

- Benzoylperoxid kan forårsage hævelse og blæredannelse på huden. Hold op med at bruge lægemidlet, hvis disse symptomer opstår.
- Ikke at få Basiron i øjnene, munden, næsebor eller på slimhinder. Får du Basiron i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rigelige mængder vand.
- At bruge Basiron med forsigtighed på halsen og på andre følsomme områder.
- At du ikke bør bruge Basiron på beskadiget hud. Der er risiko for allergi.
- At du skal undgå solbadning og UV-stråling (også solarium), mens du bruger Basiron.
- At præparatet kan blege hår, tøj og andre materialer.

Brug af anden medicin sammen med Basiron

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen eller apotekspersonalet hvis du bruger:

- Anden medicin, der virker afskallende, irriterende eller udtørrende (f.eks isotretinoin, azelainsyre).
- Anden medicin på huden, der kan ødelægges af Basiron.
- Medicin mod skader i huden (tretinoin). Du kan bruge den ene medicin om morgenen og den anden om aftenen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må kun bruge Basiron efter lægens anvisning.

Amning:

Erfaringer med Basiron er begrænsede. Du må derfor så vidt muligt ikke bruge Basiron, hvis du ammer.

Du bør ikke bruge Basiron på brystet. Barnet kan få Basiron i munden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Basiron påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Basiron indeholder propylenglycol

Basiron gel indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Basiron

Brug altid Basiron nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Før du bruger Basiron, bør huden være tør og ren.

Brug Basiron 1-2 gange daglig i et tyndt lag på den angrebne hud.

Personer med sart hud: Brug Basiron 1 gang daglig før sengetid.

Hvis du ikke opnår noget resultat med Basiron 5%, kan du starte behandling med Basiron 10%.

Hvis du har brugt for meget Basiron

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Basiron, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Du vil ikke opnå et hurtigere eller bedre resultat, hvis du bruger for meget Basiron. I stedet kan de få udtalt irritation af huden.

Hvis du har glemt at bruge Basiron

Du skal bruge Basiron, så snart du kommer i tanke om det.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger kan forekomme:

Meget almindelig (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

- Tør hud
- Rødme
- Afskalning af huden
- Brændende fornemmelse i huden

Almindelig (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

- Kløe i huden (pruritus)
- Smerte i huden (stikkende smerte)
- Hudirritation (irritativ kontaktdermatitis)

Ikke almindelige (det forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 1000 behandlede)

- Allergisk kontaktdermatitis

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Hævelse i ansigtet
- Alvorlige allergiske reaktioner
Tegnene på en alvorlig allergisk reaktion kan være:
 - hævet og kløende udslæt (nældefeber)
 - hævelse i ansigt, øjne, læber, tunge eller mund (angioødem) med vejrtrækningsbesvær
 - besvimelse

Symptomerne er normalt reversible, hvis behandlingen er reduceret i hyppighed eller afbrydes.

Afbryd behandlingen og kontakt din læge, hvis symptomerne er generende, eller du får hævelse i ansigtet eller alvorlige allergiske reaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

5. Opbevaring

Opbevar Basiron utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Basiron efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Basiron indeholder:

- Aktivt stof: benzoylperoxid.
- Øvrige indholdsstoffer: acrylat copolymer; glycerol; carbomer 940; propylenglycol; natriumedetat; natriumdioctyl sulfo-succinat; kolloid vandfri silica; poloxamer 182; natriumhydroxid; rensed vand.

Udseende og pakningstørrelse

60 g tube.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tel: +46 18 444 0330, Fax: +46 18 444 0335, E-mail: nordic@galderma.com

Fremstiller

Laboratoires Galderma

ZI Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017