Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil Junior
24 mg/ml oral suspension
paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Panodil Junior nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Junior
3. Sådan skal du tage Panodil Junior
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse
Panodil Junior virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Panodil Junior mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter, samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Junior

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten.

Tag ikke Panodil Junior,
- hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
- hvis du har meget dårlig lever.

Advarsel og forsigtighedsregler
Panodil Junior indeholder paracetamol.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Panodil Junior, hvis

- du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
- du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed eller fejlernæring. Du skal måske ikke tage Panodil Junior eller evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
- du har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.
- du har en alvorlig infektion, da den kan øge risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer:
    - dyb, hurtig og besværet vejrtrækning.
    - kvalme og opkast.
    - appetitløshed.

  Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer.

Vær opmærksom på

- Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
- Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.
- Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
- Hvis du tager Panodil Junior mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
- Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Panodil Junior. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Panodil Junior

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
- medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil Junior regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil Junior mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Brug af Panodil Junior sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil Junior i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Panodil Junior.

Du kan tage Panodil Junior under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Kontakt lægen, hvis du ikke har fået det bedre i løbet af 3 dage og stadig har behov for at tage Panodil Junior.

Du kan amme, selv om du tager Panodil Junior. Panodil Junior udskilles i modermælk, men der forventes ingen påvirkning af det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Panodil Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Panodil Junior
Panodil Junior indeholder sorbitol (E420) og maltitol (E965). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Panodil Junior indeholder natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), natriumethylparahydroxybenzoat (E215) og natriummethylparahydroxybenzoat (E219). Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandling).

3. Sådan skal du tage Panodil Junior

Tag altid Panodil Junior nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag aldrig mere Panodil Junior end beskrevet i doseringsanvisningerne. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Den maksimale døgndosis må ikke overskrides.

Den anbefalede dosis er:

Børn på 2 år og derover:
Dosis afhænger af barnets vægt.
Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.

Dosis skal beregnes ud fra barnets præcise vægt. Nedenfor er angivet eksempler:

Barnets vægt	Dosis	Maksimal døgndosis
5 kg	2,5 ml (60 mg) højst 4 gange i døgnet	250 mg
10 kg	5 ml (120 mg) højst 4 gange i døgnet	500 mg
15 kg	7,5 ml (180 mg) højst 4 gange i døgnet	750 mg
20 kg	10 ml (240 mg) højst 4 gange i døgnet	1000 mg
25 kg	12,5 ml (300 mg) højst 4 gange i døgnet	1250 mg
30 kg	15 ml (360 mg) højst 4 gange i døgnet	1500 mg
35 kg	17,5 ml (420 mg) højst 4 gange i døgnet	1750 mg
40 kg	20 ml (480 mg) højst 4 gange i døgnet	2000 mg

Doseringsinterval
Der bør minimum gå 6 timer mellem hver dosering.

Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage.

Børn under 2 år
Du må ikke bruge Panodil Junior til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Brugsanvisning
Dosering:



- Flasken med Panodil Junior omrystes grundigt og åbnes.
- Skub stemplet helt i bund på sprøjten og før den rene sprøjte ned i flasken.
- Træk langsomt stemplet på sprøjten tilbage til mærket for den dosis, der skal anvendes. Se doseringsvejledning her i indlægssedlen. For at afmåle dosis så præcist som muligt, skal kraven på sprøjten være lige ud for mærket på den dosis, der skal anvendes.
- Indfør spidsen af sprøjten i munden på barnet. Peg spidsen af sprøjten mod indersiden af kinden og tryk langsomt stemplet i bund.

Rengøring:
- Sprøjten skal rengøres efter hver brug.
- Træk stemplet helt ud af sprøjten og vask begge dele i varmt vand med sæbe.
- Skyl grundigt med varmt vand.
- Lad delene lufttørre helt inden stemplet sættes retur i sprøjten.

OBS! Brug ikke denne sprøjte, hvis den er ødelagt eller beskidt. Sprøjten må kun bruges til Panodil Junior.

Hvis du har taget for meget Panodil Junior
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Panodil Junior, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

En større dosis Panodil Junior end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.
Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven. Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelse). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Panodil Junior
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
- Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Nældefeber.
- Forhøjede levertal.
- Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser.) Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

Der har været rapporter om meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Email: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Panodil Junior utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
- Brug ikke Panodil Junior efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Panodil Junior 24 mg/ml oral suspension indeholder:

- Aktivt stof: Paracetamol.
- Øvrige indholdsstoffer: Æblesyre, xanthangummi, flydende maltitol, jordbæraroma, sorbitol (E420), natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), natriummethylparahydroxybenzoat (E219), natriumethylparahydroxybenzoat (E215), flydende sorbitol (E420), vandfri citronsyre, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Panodil Junior 24 mg/ml er en farveløs, viskøs suspension med små hvide krystaller.

Pakningsstørrelser
60, 100 eller 200 ml oral suspension.
60 ml: Flasken er pakket med en 5 ml plastik sprøjte.
200 ml: Flasken er pakket med en 8 ml plastik sprøjte.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Telefon: 80 25 16 27
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Fremstiller
FARMACLAIR, Hérouville Saint Clair, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2017